

VI. “Samuel Karchmer Krivitzky”

REPORTE Y REVISION DE 2 PACIENTES CON GANGRENA DE FOURNIER Y SU MANEJO QUIRURGICO

Introducción:

La gangrena de Fournier es una rara infección necrosante de tejidos blandos que afecta las áreas perineal, perianal y genital, con una incidencia reportada de 1.6/ 1,000,000 de la población femenina. Es una patología altamente fatal con mortalidad del 75% con índice de Laor mayor a 9, la mayoría de los casos su origen es idiopático o derivado de una infección perineal o infecciones genitales en piel. Los principales factores asociados son diabetes mellitus, abuso de alcohol e inmunosupresión.

Objetivos: Se presenta el caso de 2 pacientes con gangrena de Fournier y se revisa la literatura al respecto.

Reportes clínicos: Paciente 1, 66 años finada, presenta en su hospitalización estado hiperosmolar hiperglicémico, somnolienta Glasgow de 13, inicia días anteriores con absceso área genital, posterior dolor en genitales y región suprapúbica con cambios de coloración. Antecedentes diabetes mellitus desde hace 19 años, sin especificar tratamiento, tabaquismo desde la juventud a razón de 10 cigarrillos por día, estado depresivo crónico. manejo intrahospitalario con 3 desbridaciones profundas con Versajet aplicación de pósitos de nitrato de plata y sistema VAC y uso de sonda endoanal.

Paciente 2, 44 años, presenta a su hospitalización; Alteración del estado de alerta Glasgow 13, absceso vulvar, cetoacidosis diabética, antecedentes de importancia diabetes mellitus insulínica descompensada, presenta eritema y necrosis en región inguinal con descarga purulenta a través de cavidad vaginal. Paciente con estado depresivo crónico. Se realizan dos desbridaciones, pósitos de nitrato de plata, sistema VAC y sonda endoanal con cirugía reconstructiva.

Conclusiones: El manejo médico quirúrgico de la gangrena Fournier no se encuentra actualmente dentro de la currícula de la especialidad de Ginecología y Obstetricia sin embargo consideramos preponderante que la atención médica sea inmediata por cualquier servicio quirúrgico que tenga inherencia en la zona genital femenina ya que del tiempo de esta dependerá el pronóstico. Así mismo es importante considerar intervención por psicología ya que las pacientes que llegan en este estado, presentan un episodio depresivo que influye directamente sobre su estado de salud.



Paciente 1



Paciente 2

