Variables asociadas a la violencia de género y de pareja en la población obstétrica atendida en el Instituto Nacional de Perinatología

S.I Pacheco Ruiz (1) , R.G Hernández Cruz (2) , A.B Seligson Ríos(3)

1.Médico residente de 4to año Instituto Nacional de Perinatología, 2- Jefa de departamento Fomento y Herramientas educativas Instituto Nacional de Perinatología,3- Jefa de departamento de Gestión Técnico Médico Administrativo de Medicina Perinatal y Ginecológico, Instituto Nacional de Perinatología

Introducción: La violencia de género es un fenómeno social altamente perjudicial en diversos aspectos en la vida de la mujer que la padece. En México, alrededor del 60% de mujeres embarazadas, refieren haber presentado cualquier tipo de violencia antes del embarazo por parte de su pareja; las consecuencias de la misma se pueden medir a corto, mediano y largo plazo entre las que se incluyen enfermedades ginecológicas, complicaciones durante el embarazo, enfermedades de transmisión sexual, trauma emocional, discapacidad e incluso la muerte.

Objetivo: Revisar las principales características sociodemográficas de las pacientes embarazadas víctimas de violencia de género y de pareja e identificar el grado de correlación, así como describir los resultados perinatales obtenidos.

Métodos: Se realizó un análisis retrospectivo tipo analítico con revisión de expedientes de pacientes embarazadas las cuales dieron positivo a tamiz de violencia realizado en el Instituto Nacional de Perinatología en el periodo comprendido entre Junio 2016 y Junio 2022

Resultados: Se obtuvo un total de 210 pacientes. Se observó una frecuencia de presentación mayor en el rango de edad de 20-25 años (26.6%), seguido del grupo de 15-20 años (19.05%), predomina la ocupación ama de casa con 61.43%. Se encontró una prevalencia de comorbilidades psiquiátricas en el 63.3% dentro del cual el consumo de sustancias en un 39.10%. El año con mayor detección fue el 2018 con un total de 43 casos. 40% de las pacientes refirieron haber presentado violencia durante su infancia, 20.9% sufrió violencia por 3eras personas y un 80% refiere antecedente de violencia por parte de su pareja actual en cualquier momento de la relación con un 69.5% de violencia antes del embarazo. La violencia de pareja más prevalente fue la psicológica en un 70.9%. Se encontró asociación estadísticamente significativa con antecedente de violencia en la infancia con la presentación de violencia física durante el embarazo OR 2.78 (IC 95% 1.0543-7.24) así como el consumo de sustancias en la pareja OR 3.45 (IC 95% 2.4-16.43). El antecedente de violencia física en la infancia demostró una asociación con la violencia sexual de pareja durante el embarazo OR 3.31(IC 95 1.58-6.93) así como la violencia por 3eras personas OR 2.718 (IC 95% 1.079-6.85).Para todos los tipos de violencia durante el embarazo se encontró asociación con el antecedente de violencia en la pareja actual La media de edad gestacional al ingreso fue de 14.2 semanas, con un promedio de consultas prenatales de 4. Con respecto a los resultados perinatales 66.1% tuvo una resolución a término con una media de peso neonatal de 2833.5 gramos.



Imagen 1. Diagrama de Venn sobre la relación de los diferentes tipos de violencia de pareja reportados en mujeres embarazadas



Gráfica 1. Antecedentes de presentación de la violencia de género

Conclusiones: La presentación de la violencia de género durante cualquier etapa de la vida de una mujer en la población observada es tan alta como la obtenida en registros nacionales e internacionales; entre los principales factores que la involucran son los antecedentes de haber sufrido violencia en la infancia o haber sufrido violencia previamente por parte de la pareja. Entre las comorbilidades asociadas la presentación de enfermedades psiquiátricas conlleva un gran porcentaje de las mismas, así mismo se observa que la presencia de violencia de género y de pareja disminuye la adherencia al control prenatal y al inicio del mismo de manera oportuna. Como médicos ginecólogos nos encontramos en una posición única para evaluar y proveer un adecuado manejo a todas las mujeres víctimas de violencia de género, tenemos distintas oportunidades para entrevistarlas durante las consultas otorgadas.

El colegio americano (ACOG) recomienda realizar una evaluación sobre la violencia de género en la primer consulta prenatal, 1 vez por trimestre y 1 vez durante el puerperio, Así mismo recomienda a los médicos e instituciones mantener una relación directa con recursos comunitarios que apoyen a las víctimas.

-Avila-Burgos L, Valdez-Santiago R, Híjar M, del Rio-Zolezzi A, Rojas-Martínez R, Medina-Solís C. Factors Associated with Severity of Intimate Partner Abuse in Mexico: Results of the First National Survey of Violence Against Women. Canadian Journal of Public Health. 2009

-Castro R, Peek-Asa C, Ruiz A. Violence Against Women in Mexico: A Study of Abuse Before and During Pregnancy. American Journal of Public Health. 2003